
NITA-FARM®
ветеринарная фармацевтика

Профессионализм и ответственность в каждом решении

ЭНРОНИТ®OR

Энрофлоксацин 10%, колистин 1 000 000 МЕ
Раствор для перорального применения

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ЭНРОФЛОКСАЦИНА И КОЛИСТИНА, ОБЛАДАЮЩИЙ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В БОРЬБЕ С КОЛИБАКТЕРИОЗОМ У ПТИЦ И СВИНЕЙ




АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Энронит® OR





ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективнее монопрепаратов на основе энрофлоксацина с сопоставимой стоимостью курса лечения;
- Высокая активность за счет синергизма действующих веществ.

ОПИСАНИЕ

Энронит® OR - комплексный препарат на основе энрофлоксацина и колистина, обладающий высокой эффективностью в борьбе с колибактериозом у птиц и свиней.
Энронит® OR по внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета с легкой опалесценцией.
Препарат выпускают расфасованным по 20 и 100 мл в стеклянные флаконы, по 1 л в полимерные бутылки и по 5 л в полимерные канистры.

СОСТАВ

1 мл ЭНРОНИТ OR = 100 мг энрофлоксацин, 1 000 000 МЕ колистин

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комбинация входящих в состав препарата Энронит® OR энрофлоксацина и колистина сульфата, обладая синергидным действием, обеспечивает широкий спектр антимикробной активности препарата в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.


Энрофлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов, колистина сульфат – соединение группы полипептидных антибиотиков.

Механизм действия энрофлоксацина основан на ингибировании активности фермента ДНК-гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки, что приводит к нарушению синтеза белков и подавлению роста деления и развития грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. Escherichia coli, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium perfringens, Enterobacter spp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella spp., Erysipelothrix spp., Actinobacillus spp., Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Corynebacterium pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, а также Mycoplasma spp.

Механизм действия колистина сульфата заключается в нарушении проницаемости клеточной стенки бактерии путем соединения с липопротеинами, что приводит к нарушению внутриклеточного метаболизма и вызывает гибель грамотрицательных бактерий, в т.ч. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Salmonella spp., Proteus spp.

После перорального применения препарата энрофлоксацин хорошо и быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в органы и ткани, выводится из организма преимущественно в неизмененном виде с мочой и частично с фекалиями; колистина сульфат практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте, не накапливается в органах и тканях, из организма выводится преимущественно в неизмененном виде с фекалиями.

ВЫСОКАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭНРОНИТ OR В СРАВНЕНИИ С МОНОПРЕПАРАТОМ



1 – раствор энрофлоксацина (100 мг/мл);
2 - Энронит OR

Синергизм действующих веществ обеспечивает высокую эффективность применения препарата

[1]Согласно результатам исследования чувствительности штамма Salmonella enteritidis к применяемым антибактериальным препаратам. На графике представлены зоны (мм) вокруг индикаторных дисков соответствующих препаратов, помещенных в микробную среду Salmonella enteritidis.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Энронит® OR назначают сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, хронических респираторных заболеваниях, стрептококкозе, некротическом энтерите, гемофилезе, микоплазмозе, смешанных инфекциях и вторичных инфекциях при вирусных болезнях; поросятам – при колибактериозе и энтеритах бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину и колистину.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка	Курс лечения
Бройлеры, племенная птица, ремонтный молодняк кур, индейки	Путем выпаивания	0,5 мл/1 л питьевой воды	3-5 дней, при смешанных инфекциях, сальмонеллезе, а также при хронических формах заболеваний – не менее 5 дней
Поросята	Путем выпаивания с водой (в разведении 1:1)	0,3 мл/кг м.ж. (при тяжелой форме заболевания - 0,5 мл/кг м.ж.)	2-3 дня

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Энронит® OR запрещается применять животным с заболеваниями центральной нервной системы, почек и печени, микозами, при сверхчувствительности к энрофлоксацину. Запрещается применение препарата ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки и курам-несушкам, яйца которых будут использоваться в пищу, ввиду выделения энрофлоксацина с яйцами.

Лекарственный препарат не применяется супоросным и лактирующим свиноматкам, а также новорожденным поросятам, ввиду отсутствия данных по изучению влияния на организм.

Не допускается применение препарата Энронит® OR одновременно с левомицетином, макролидами, тетрациклинами, теофиллином, нестероидными противовоспалительными лекарственными препаратами, препаратами магния и кальция.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Убой птицы на мясо разрешается не ранее чем через 11 суток, свиней – не ранее чем через 14 суток после последнего применения лекарственного препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, используют для кормления плотоядных животных.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.



Для точного расчета необходимого объема препарата Энронит® OR воспользуйтесь КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК на сайте WWW.NITA-FARM.RU

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТАХ НА САЙТЕ КОМПАНИИ

для перехода на страницу продукта отсканируйте QR-код

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА

ANIMALPROFI

ONLINE РЕСУРС **WWW.ANIMAL-PROFI.RU**

Тел. +7 (8452) 338 600
Бесплатные звонки по России 8 800 700 02 20
ООО «ТД «НИТА-ФАРМ» +7 495 136 62 55