

ЗУРАТРОЛ[®]

НОВИНКА

Толтразурил

Суспензия для приема внутрь

ПРОВЕРЕННЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ТОЛТРАЗУРИЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ЭЙМЕРИОЗА У МОЛОДНЯКА КРС И СВИНЕЙ С ОДНОКРАТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ
И ШИРОКИМ СПЕКТРОМ АНТИКОКЦИДИЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

ЗАЩИТА МОЛОДНЯКА ОТ ЭЙМЕРИОЗА



АНТИКОКЦИДИЙНЫЙ ПРЕПАРАТ





АНТИКОКЦИДИЙНЫЙ ПРЕПАРАТ

Зуратрол®



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенная поедаемость за счет корректоров вкуса
- Однократное применение
- Качество мировых лидеров

ОПИСАНИЕ

Зуратрол® – антикокцидийный препарат группы триазинтриона.

Назначают пороссятам и молодняку крупного рогатого скота с лечебной и лечебно-профилактической целью при кокцидиозе.

По внешнему виду Зуратрол® представляет собой суспензию от кремового до серо-коричневого цвета. При хранении допускается расслоение, исчезающее при взбалтывании.

Перед применением препарат тщательно взболтать.

Зуратрол® выпускают расфасованным по 500 мл и 1 л в полимерные бутылки соответствующей вместимости, закупоренные навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия.

СОСТАВ

1 мл
ЗУРАТРОЛ



50 мг толтразурил

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром антикокцидийного действия, эффективен в отношении *Isospora suis*, *Eimeria arloingi*, *Eimeria scabra*, *Eimeria guevarai*, *Eimeria bovis*, *Eimeria zuernii*, *Eimeria alabamensis* и других видов кокцидий, паразитирующих у свиней и крупного рогатого скота, на стадиях их внутриклеточного развития. Блокируя дыхательные ферменты, толтразурил оказывает повреждающее действие на митохондрии и процессы деления ядра кокцидий, нарушая процесс формирования макрогаметоцитов.

После перорального введения препарата Зуратрол®, толтразурил медленно всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает кокцидиоцидное действие на слизистой и подслизистых оболочках. В организме частично метаболизируется путём сульфокисления и гидроксирования, с образованием производных сульфоксида и сульфона.

Выводится толтразурил из организма в основном в неизменном виде (70%), а также в виде метаболитов с фекалиями и частично с мочой.


Зуратрол® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007–76), в умеренных дозах не вызывает у поросят и телят побочных явлений и осложнений, не препятствует формированию иммунитета к кокцидиозу.

РОССИЙСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ИМПОРТНОМУ АНАЛОГУ

Импортные аналоги на основе толтразурила широко известны и занимают лидирующие позиции в терапии эймериоза КРС и свиноводства по сравнению с другими лекарственными средствами. По составу, механизму действия и свойствам

Зуратрол® идентичен популярному импортному препарату.

Динамика изменения концентрации толтразурила в плазме крови свиней после применения препарата импортного аналога и Зуратрол, линейная шкала



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Зуратрол® назначают поросятам и молодняку крупного рогатого скота с лечебной и лечебно-профилактической целью при кокцидиозе.

Перед применением препарат тщательно взболтать в течение 30 секунд.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВИД ЖИВОТНОГО	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗИРОВКА	КУРС ЛЕЧЕНИЯ
Телята	перорально индивидуально однократно с помощью дозирующего устройства	с 2-недельного возраста в дозе 3 мл суспензии на 10 кг массы тела животного	1 раз в сутки
Поросята		на 3-5-й день жизни в дозе 0,4 мл суспензии на 1 кг массы тела животного, но не менее 0,5 мл и не более 2 мл на животное	

Для достижения максимального профилактического эффекта и снижения количества ооцист, выделяемых во внешнюю среду, в неблагополучных по кокцидиозу хозяйствах препарат следует назначать животным до появления в стаде первых клинических признаков заболевания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Животным с развитым рубцовым пищеварением препарат применяют при необходимости под контролем ветеринарного врача на основании оценки соотношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

Запрещается применение Зуратрол® дойным коровам ввиду его выделения с молоком.

ОГРАНИЧЕНИЯ



**Поросята - 70 суток,
Молодняк КРС – не ранее чем через 63 дня** после последнего применения Зуратрол®

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.



Для точного расчета необходимого объема препарата воспользуйтесь **КАЛЬКУЛЯТОРОМ ДОЗИРОВОК** на сайте WWW.NITA-FARM.RU



Переходите в раздел сайта НИТА-ФАРМ: В ПОМОЩЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ



УДОБНАЯ НАВИГАЦИЯ

Болезни указаны в соответствии с системами органов, где протекает патологический процесс. Алфавитный указатель поможет Вам быстро найти ответы на интересующие вопросы



РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЗАДАЧ

Схемы лечения от НИТА-ФАРМ



WWW.NITA-FARM.RU/VETVRACHAM/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.