

ДОКСИЛОКС[®] OR

Доксициклин 10%
Раствор для перорального применения

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ
ДОКСИЦИКЛИНА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СВИНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА





АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

Доксилокс® OR

Стабильность результатов




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стабильность в жесткой воде
- Антибиотик тетрациклинового ряда последнего поколения
- Точность дозировки

ОПИСАНИЕ

Профессиональный антибактериальный препарат на основе доксициклина в форме перорального раствора для промышленного свиноводства и птицеводства.

СОСТАВ



100 мг доксициклина гиклат

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Доксициклин, входящий в состав препарата, относится к полусинтетическим антибиотикам третьего поколения тетрациклиновой группы. Механизм бактериостатического действия доксициклина связан с угнетением энзимов, что приводит к нарушению синтеза белка микробной клетки. Активен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:

- **Escherichia coli**
- **Haemophilus spp.**
- **Pasteurella spp.**
- **Salmonella spp.**
- **Staphylococcus spp.**
- **Streptococcus spp.**
- **Clostridium spp.**
- **Chlamydia spp.**
- **Listeria spp.**
- **Leptospira spp.**
- **Mycoplasma spp.**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Доксилоск OR назначают свиньям и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, стафилококкозе, микоплазмозе, хронических респираторных заболеваниях бактериальной этиологии и других инфекциях, возбудители которых чувствительны к доксициклину.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Птица	Перорально	0,5-1 мл/1 л питьевой воды	3-5 дней
Свиньи		1 мл/10 кг м. ж.	5 дней

Препарат Доксилоск OR применяют индивидуально или групповым способом. При групповом способе применения свиньи и птица в период лечения должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Лечебный раствор препарата Доксилоск OR, рассчитанный на потребление в течение суток, готовят ежедневно. При применении не использовать ржавые поилки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не применять с кортикостероидами и эстрогенами, а также миорелаксантами.

Запрещается применение препарата Доксилоск OR животным с печеночной недостаточностью, беременным и лактирующим самкам.

Препарат нельзя применять курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки.

ОГРАНИЧЕНИЯ

10 суток - СВИНЬИ,
6 суток - ПТИЦА

Не допускается применение в пищу яиц от птиц, которым проводилось лечение доксициклином.


СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.



В ПОМОЩЬ ВЕТЕРИНАРНОМУ ВРАЧУ

интерактивный раздел сайта НИТА-ФАРМ для специалистов, помогающий с решением ключевых ветеринарных задач



Отсканируйте, чтобы перейти в раздел

КАЛЬКУЛЯТОР ДОЗИРОВОК

раздел сайта НИТА-ФАРМ для точного расчета объема препарата



Отсканируйте, чтобы перейти в раздел

Подписывайтесь на

КАНАЛЫ НИТА-ФАРМ

Актуальные статьи, полезные материалы



Отсканируйте, чтобы перейти на канал